

Site Natura 2000 « Hauts de Meuse »

DOCOB : Diagnostic socio-économique

Type de propriété forestière	Nom
Forêts Domaniales = 5 50%	FD d'Appremont la forêt FD de Dommartin au four FD de Gaumont FD de Hasoy FD de Liouville
Forêts Communales = 11 40%	FC d'Appremont la forêt FC de Buxières sous les côtes FC d'Euville FC de Fréméréville sous les côtes FC de Géville FC de Han (Ailly – Brassett) FC de Saint – Mihiel FC de Sorcy St Martin FC de Troussey FC de Varnéville FC de Vignot
Forêts privées	aucune forêt à PSG uniquement des petites propriétés forestières

5 UT :

- En Meurthe-et Moselle :
 - UT du Toulouis
- En Meuse :
 - UT de Commercy
 - UT de Saint-Mihiel
 - UT de Vaucouleur
 - UT de Vigneulles-les-Hattonchâtel



Type de forêt	A l'échelle des 19 communes	A l'échelle des périmètres désignés au titre de Natura 2000
forêts de feuillus	92,64 % - 14 789 ha	89,9 % - 626,5 ha
forêts de conifères	2,60 % - 416 ha	2,7 % - 18,6 ha
forêts mélangées	4,76 % - 761 ha	7,4 % - 51,1 ha
Type de propriété	A l'échelle des 19 communes	A l'échelle des périmètres désignés au titre de Natura 2000
forêt domaniale	19,62 % - 3 455,87 ha	48,12 % - 366,98 ha
forêt communale	56,30 % - 9 919,27 ha	38,11 % - 290,59 ha
forêt privée	24,08 % - 4 241 ha	13,77 % - 105 ha

Site Natura 2000 « Hauts de Meuse »

20 stations forestières :



- Hêtraie Chênaie mésophile de versant,
- Hêtraie Chênaie mésophile de plateau,
- Hêtraie Chênaie mésophile à mésophile à tendance acidophile,
- Hêtraie Chênaie mésoxérophile de plateau,
- Hêtraie Chênaie mésoxérophile à mésophile,
- Hêtraie Chênaie mésoxérophile à mésophile (calcaire peu démantelé ou calcaire fissuré et marneux),
- Hêtraie Chênaie xérophile,
- Hêtraie Chênaie xérophile de plateau,
- Hêtraie Chênaie neutrophile de plateau,
- Hêtraie Chênaie de versant Sud,
- Hêtraie Frênaie de bas de versant,
- Hêtraie de versant Est ou Ouest mésophile,
- Hêtraie de versant Est ou Ouest mésoxérophile,
- Hêtraie de versant mésoxérophile,
- Hêtraie de versant Nord à Erable et Tilleul,
- Aulnaie et Aulnaie Frênaie,
- Chênaie pédonculée Charmaie,
- Frênaie Erablaie de fond de vallon,
- Frênaie Erablaie de fond de vallon étroit
- Friches et Pelouses,

Essence objectif : Hêtre
Chêne sessile, grands érables, fruitiers

Régénération naturelle
Diminution des résineux

Futaie irrégulière

Actions « biodiversité » grandissantes
Mais pas chiffrées

Site Natura 2000 « Hauts de Meuse »

9130 : Hêtraies neutrophiles collinéennes et montagnardes

FORETS



Hêtraie chênaies à Aspérule odorante et Mélisque uniflore

Site Natura 2000 « Hauts de Meuse »

9180 : Erablaies sur éboulis ou de fond de vallon : Habitat prioritaire

FORETS






Site Natura 2000 « Hauts de Meuse »



9180-4 : Erablaie à Scolopendre







9180-11 = Tillaie sèche à Erable sycomore et Erable plane







9160 : Chênaies pédonculées hygrocines sur sols argilo-limoneux





91E0 : Forêts alluviales à Saules, Aulnes et Frênes





Flore remarquable des vallons froids





9150 = Hêtraies-chênaies calcicoles médio-européennes



Site Natura 2000 « Hauts de Meuse »

FORETS



**Flore remarquable
des hêtraies sèches**



Site Natura 2000 « Hauts de Meuse »

Crapaud Sonneur à ventre jaune



Triton crêté

Alyte accoucheur

Salamandre tâchetée



Suivi du crapaud sonneur de 1998 à 2006





Site Natura 2000 « Hauts de Meuse »

Chauves-souris : 6 espèces inscrites à l'annexe 2 de la Directive habitat



Site Natura 2000 « Hauts de Meuse »

Les gîtes à chauves-souris (Cpepesc, 2011)

Vespertilion de Natterer
(100 à 150 Ind.)



Vespertilion de Natterer

Vent, blessure, etc.

Vespertilion d'Alcathoe
(30 ind.)

Site Natura 2000 « Hauts de Meuse »

Les gîtes à chauves-souris (Cpepesc, 2011)

Vespertilion
de Brandt
(8 ind.)



Chandelles



Vespertilion de Brandt et
Vespertilion de Natterer
(180 ind.)




Vespertilion
de Brandt
(180 ind.)

Site Natura 2000 « Hauts de Meuse »

Les gîtes à chauves-souris (Cpepesc, 2011)

Barbastelle (10 ind.)

Vespertilion d'Alcathoe
(10 ind.)



Dépérissement

Barbastelle (10 ind.)

Site Natura 2000 « Hauts de Meuse »

Les gîtes à chauves-souris (Crepesc, 2011)

FORETS




Noctule de Leisler
(36 ind.)



Vespertilion de Bechstein
(40 ind.)

Loges de pics

Les autres espèces



Espèces d'intérêt communautaire

Chauves-souris

Oiseaux forestiers cavernicoles

Rapaces et Cigogne noire

Lucane Cerf-volant

Triton crêté

Chat sauvage



Espèces végétales protégées

Conserver une futaie âgée

Conserver des arbres « bio »

Conserver des boisements humides

Quiétude des espèces en reproduction







2006





EN ROUTE !